

# Mathématiques.

## 1<sup>re</sup> Question.

Exposer, sur une équation d'un degré quelconque, le moyen d'obtenir 1° une limite supérieure des racines positives; 2° une limite inférieure des racines négatives, c'est à dire un nombre plus grand numériquement que toutes les racines de ce dernier genre: puis, appliquer ce résultat à l'équation suivante que l'on débarrassera d'abord de tout dénominateur.

$$\frac{x^3 - 12}{x^2 - 2} = \frac{4}{x} - \frac{3}{x^2} + \frac{3}{x^2 - 2}.$$

## 2<sup>e</sup> Question



Exposer sur l'équation générale des courbes du 2<sup>e</sup> degré, la méthode qui sert à trouver les asymptotes, directement, et sans avoir besoin d'effectuer une transformation de coordonnées. On appliquera ensuite cette méthode à la courbe.

$$y^2 + 3x^2 - 4xy + x + 2y - 1 = 0.$$

Donc il faudra d'ailleurs construire les lignes ou points remarquables, tels que le centre, les diamètres, les axes &c.

---

N.B. Les deux questions précédentes sont également obligatoires, et les candidats doivent être privés du secours de tout ouvrage de mathématiques.

(\*) Indiquer ici les nom et  
prénoms.

Gilbert

né le an a

département d

(\*\*) Les élèves de la classe  
de Rhétorique indiqueront s'ils  
sont vétérans.

Élève du Collège

(\*\*)

(\*\*\*) Placer ici la devise.

(\*\*\*)

1<sup>re</sup> Question.

1<sup>re</sup> Méthode



Soit  $F(x) = 0$  l'équation pour la quelle on demande la limite supérieure  $k$  des racines, et de la quelle nous supposons pour plus de simplicité le plus haut terme positif. Comme l'hypothèse  $x = +\infty$  donne pour résultat  $F(x) > 0$ , et qu'aucune racine ne doit être comprise entre  $+\infty$  et une limite supérieure des racines, il faut que toute limite supérieure des racines substituée dans l'équation doit donner un résultat positif. Mais  $k$  étant une limite,  $k+z$ , ( $z$  étant positif) en est encore une. Donc  $F(k+z)$  doit être positif pour toute valeur positive de  $z$ . Et réciproquement si  $F(k+z)$  est positif pour toute valeur positive de  $z$ ,  $k$  sera limite. Car aucune valeur quel que soit supérieure à  $k$  n'annulera  $F(x)$ .

Il faut donc et il suffit que pour toute valeur positive de  $z$ , on ait  $F(k+z)$  entier positif.

$$F(k) + F'(k)z + \frac{1}{2}F''(k)z^2 + \frac{1}{2.3}F'''(k)z^3 + \dots$$

Et cette condition sera évidemment remplie, si l'on suppose que tous les coefficients de  $z$  dans cette fonction soient positifs.

Ainsi, on n'a qu'à résoudre le système d'inégalités

$$F(k) > 0, F'(k) > 0, F''(k) > 0, \dots, F^{(m-1)}(k) > 0$$

Pour cela, on cherche le plus petit nombre entier qui satisfont à la dernière, puis le plus petit nombre entier qui satisfont à la fois aux deux dernières, puis aux trois, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait le plus petit nombre qui rende tous ces termes positifs. Arrivé à ce nombre, on aura la limite supérieure cherchée.

Si l'on demandait au contraire la limite inférieure  $l$  des racines, on ferait dans  $F(x)$ ,  $x = -y$ , on chercherait la limite supérieure  $k$  des racines de l'équation  $F(-y) = 0$ , et l'on ferait  $l = -k$ , et comme  $k$  est plus grand que toutes les valeurs de  $y$ , il résulterait que  $-k$  ou  $l$  est plus petit que toutes celles de  $-y$  ou de  $x$ .

On peut présenter cette règle, appelée Méthode de Newton, d'une manière un peu plus simple.

Puisque  $k$  est plus grand et plus petit que toutes les racines de l'équation  $F(x) = 0$ , il faudra que l'équation en  $z$ ,  $F(k+z) = 0$  n'ait pas de racines  $> 0$ , sans quoi  $F(x) = 0$  aurait des racines  $> k$ ; et de même, que l'équation en  $z$ ,  $F(l+z) = 0$ .

n'est pas de racines  $< 0$ , sans que  $E(x=0)$  aurait de racines  $< 1$ . Les conditions à exprimer sont donc que  $E'(k+2)=0$  n'ait ~~de~~ pas de racines positives, et que  $E(k+2)=0$  n'en ait pas de négatives. Il suffit pour cela que la première n'ait que des racines positives, et la seconde, que des variations de signe. C'est qui donnera encore deux systèmes d'inégalités à résoudre dans l'un desquels  $k$  est l'unité  $L$ .

2<sup>e</sup> Méthode.

La 1<sup>re</sup> méthode donne en général des approximations assez bonnes, mais on voit qu'elle est longue et pénible dans la pratique. En voici une plus expéditive.

Soit  $m$  le degré de l'équation,  $n+1$  le rang du premier terme négatif,  $N$  le plus grand des coefficients des termes négatifs, puis positivement, on satisfait l'équation ~~de la forme~~ ~~de coefficients fractionnaires~~, soit de la forme

$$x^m + \dots + Hx^{m-n+1} - Kx^{m-n} \dots - Nx^p \dots = 5x = 0 \quad (1)$$

Il s'agit d'abord de trouver un nombre positif qui dans ce polynôme en résultat positif ainsi que tout nombre plus grand. Or l'inégalité  $E(x) > 0$  est évidemment satisfaite par toute solution positive de l'inégalité

$$x^m - Nx^{m-n} - Nx^{m-n-1} \dots - Nx - N > 0 \quad (2)$$

Soit  $x^m - N \frac{x^{m-n+1}}{x-1} > 0$ . Cette inégalité n'est pas satisfaite en général par 1, la marche que nous suivons ne peut nous faire espérer de limite  $< 1$ . ~~Si nous posons 4 fois  $x = 1 + \frac{1}{n}$ , elle devient  $x > 1 + \frac{1}{n}$ ; elle devient~~

$$(1 + \frac{1}{n})^m - \frac{N}{n} [(1 + \frac{1}{n})^{m-n+1}] > 0 \quad (3)$$

~~On suppose  $x = 1 + \frac{1}{n}$ ,  $(1 + \frac{1}{n})^m - \frac{N}{n} [(1 + \frac{1}{n})^{m-n+1}] > 0$~~

On suppose donc dans l'équation (2),  $x-1$  positif et nous pourrions faire disparaître le dénominateur: elle deviendra, en faisant passer  $N$  dans l'autre membre,

$$x^m(x-1) - Nx^{m-n+1} > N \quad (3)$$

Inégalité qui sera satisfaite par toute solution de l'inégalité

$$x^m(x-1) - Nx^{m-n+1} > 0 \quad \text{ou} \quad x^{m-1}(x-1) - N > 0$$

Et cette dernière sera satisfaite tant que  $(x-1)^m - N$  ne sera pas  $< 0$ , d'où quand  $x = 1 + \sqrt[m]{N}$ . Donc  $1 + \sqrt[m]{N}$  est une limite supérieure des racines de l'équation (1).

Si l'on demandait la limite inférieure, on ferait la transformation indiquée et on

Répétition du numéro  
et de la devise.

est (on en déduirait cette règle :

N'étant le plus grand des termes négatifs de rang impair et positif de rang pair puis positif,  $x^{n+1}$  étant le membre des rangs de ces termes,  $1 + \sqrt[n]{n}$  sera, en signe contraire, la limite inférieure cherchée.

Exemple

On a l'équation

$$x^3 - \frac{12}{x^2-2} = \frac{4}{x} - \frac{3}{x^2} + \frac{3}{x^2-2}$$

Elle devient, multipliant par  $x^2(x^2-2)$  et ordonnant

$$x^7 - 2x^5 - 4x^3 - 12x^2 + 8x - 6 = 0 \quad (1)$$

Si l'on demande la limite supérieure des racines de cette équation, et qu'en employant d'abord la première méthode, on cherche d'abord les coefficients de 2 dans  $f(x+x)$ , et remarquant on suppose tous ces coefficients  $> 0$  et remarquant des inégalités aux premières, on aura le plus petit nombre qui les satisfait toutes. Voici le type du calcul

$x^7 - 2x^5 - 4x^3 - 12x^2 + 8x - 6$	3
$7x^6 - 10x^4 - 12x^2 - 24x + 8$	2
$21x^5 - 20x^3 - 12x - 12$	2
$35x^4 - 20x^2 - 4$	1
$35x^3 - 10x$	1
$21x^2 - 2$	1
$x$	2



3 est dans la limite supérieure demandée. Dans cet exemple, c'est la limite exacte la plus approchée car  $x$  donne un résultat négatif dans l'équation. La même méthode donnerait pour limite  $1 + \sqrt[7]{12}$  qui tombe entre 2 et 3, et est, comme on voit, moins approchée.

Cherchons-nous de la limite inférieure et faisons pour cela  $x = -y$ , l'équation devient

$$x^7 - 2x^5 - 4x^3 + 12x^2 + 8x + 6 = 0$$

la première méthode donnera le résultat suivant

$x^7 - 2x^5 - 4x^3 + 12x^2 + 8x + 6$	2
$7x^6 - 10x^4 - 12x^2 + 24x + 8$	2
$21x^5 - 20x^3 - 12x + 12$	1
$35x^4 - 20x^2 - 4$	1
$35x^3 - 10x$	1
$21x^2 - 2$	1

-2 est dans la limite cherchée. La seconde méthode donne  $-(1 + \sqrt[7]{12})$  ou -3 qui est encore moins approchée.

L'équation  $x^7 - 2x^5 - 4x^3 - 12x^2 + 8x - 6 = 0$  n'ayant que deux racines réelles, elle se décompose en deux facteurs

L'équation  $x^7 - 2x^5 - 4x^3 - 12x^2 + 8x - 6 = 0$  n'ayant, si l'on veut, que deux racines réelles n'aura tout au plus deux racines entre -2 et 0; n'ayant de même que trois variations, elle aura tout au plus trois racines positives.

## Des Asymptotes.

Une asymptote d'une courbe est une droite qui s'approche indéfiniment d'une courbe & se confond avec elle à l'infini. Cherchons, d'après cela, une règle pour déterminer les asymptotes d'une courbe fermée.

Supposons d'abord que l'équation de la courbe soit du  $m$  ième degré, et de la forme

$$T_m + T_{m-1} + T_{m-2} + \dots = 0 \quad (1)$$

$T_m, T_{m-1}, \dots$ , étant des fonctions homogènes de  $x$  et  $y$  d'ordres croissant jusqu'au  $m$  ième degré. Soit  $y = ax + b$  une asymptote de cette courbe. Supposons que (ou bien supposons que l'asymptote ne soit pas parallèle à l'axe des  $y$ , parce qu'en fait il n'existe pas car en ~~not~~ changeant partout  $y$  en  $x$ ).

Si l'on divise l'équation (1) par  $x^m$ , l'équation (2) par  $x$ , et qu'on y suppose  $x$  infini, elles se réduisent à  $\frac{1}{x^m} T_m = 0$ ,  $\frac{y}{x} = a$ . Et pour que les deux lignes se confondent à l'infini, il faut évidemment que leurs équations aient lieu au même temps à l'infini quand  $x$  est infini (parce que la droite n'est pas parallèle à l'axe des  $y$ ). Donc les deux équations  $\frac{1}{x^m} T_m = 0$ ,  $\frac{y}{x} = a$ , doivent avoir lieu en même temps, c'est à dire que  $a$  doit être une racine de l'équation en  $\frac{y}{x}$ ,  $\frac{1}{x^m} T_m = 0$  ( $\frac{y}{x}$ ), ou d'autres termes  $y - ax$  doit être un diviseur de  $T_m$ . C'est la première condition pour que la droite  $y - ax$  soit une asymptote de la courbe (1).

Soit donc  $T_m = (y - ax) \times Q$ , et mettons l'équation (1) sous la forme

$$(y - ax) \times Q + T_{m-1} + T_{m-2} + \dots = 0$$

Si on divise cette équation par  $x^{m-1}$  et qu'on y suppose  $x$  infini, elle se réduit à  $(y - ax) \times \frac{Q}{x^{m-1}} + \frac{1}{x^{m-1}} T_{m-1} = 0$ . Mais  $\frac{Q}{x^{m-1}}$  et  $\frac{1}{x^{m-1}} T_{m-1}$  sont des fonctions entières de  $\frac{y}{x}$  ou de  $a$ , et ces fonctions ne sont autres que ce que devien-  
nent  $Q$  et  $T_{m-1}$  quand on y fait  $x = 1$ ,  $y = a$ . Faisant donc ces substitutions l'équation devien-  
dra  $y - ax = - \frac{T_{m-1}}{Q}$ . C'est la valeur de  $b$ . Cette valeur sera toujours réelle et finie quand  $Q$  a sera réel et qu'il n'y aura pas plusieurs facteurs de  $T_m$  égaux à  $Q$   $y - ax$ .

Au lieu de substituer dans  $\frac{Q}{x^{m-1}}$ ,  $a$  pour  $\frac{y}{x}$ , on peut prendre la fonction dérivée de  $\frac{T_m}{x^m}$  par rapport à  $\frac{y}{x}$  et y substituer  $a$ , car  $Q$  n'est autre chose que  $\frac{T_m}{x^m}$  ce qui devient  $0$  quand  $\frac{y}{x} = a$ .

Voici donc la règle générale: soit  $y - ax$  un facteur de  $T_m$ ; substituez dans  $T_m$  pour  $x, 1$  pour  $y, a$ , et prenez la dérivée par rapport à  $a$ . substituez dans  $T_m$  pour  $x, 1$  pour  $y, a$  et prenez la fonction dérivée par rapport à  $a$ . Divisez ce résultat pris en signe contraire par le précédent, et vous aurez la valeur de  $b$ .

Nous allons appliquer cette règle générale aux courbes du second degré dont l'équation est

$$Ay^2 + Bxy + Cx^2 + Dy + Ex + F = 0$$

(\*) Indiquer ici les nom et prénoms.

né le an à département d

(\*\*) Les élèves de la classe de Rhétorique indiqueront s'ils sont vétérans.

Élève du Collège

(\*\*)

(\*\*\*) Placer ici la devise.

(\*\*\*)

On a ici  $m=2$ ,  $T_2 = Ay^2 + Bxy + Cx^2$ ,  $T_1 = Dy + Ex$ . Les deux facteurs de la forme  $y - ax$  dans lesquels se décomposent  $T_2$  sont déterminés par les deux valeurs de  $a$ ,  $a = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$ . On en déduit par la règle générale,  $b = -\frac{Da + E}{2Aa + B}$ . Les valeurs de  $a$  et  $b$  n'étant réelles que dans le cas où  $B^2 - 4AC$  n'est pas  $< 0$ , l'éllipse n'a pas d'asymptotes. De plus quand  $B^2 - 4AC = 0$ , la valeur de  $b$  étant infinie, la parabole n'en a pas non plus d'asymptotes. Dans le cas de l'hyperbole, les valeurs de  $a$  étant toujours réelles et les valeurs de  $b$  toujours finies, les asymptotes sont réelles et au nombre de deux.

On voit ici, comme dans le cas général, que les asymptotes ne dépendent que des termes du même et du  $m-1$  em degré, c'est à dire dans ce cas des termes dépendants des variables.

Donc l'équation qui représente, dans le cas de l'hyperbole, le système de asymptotes, aura les mêmes termes dépendants que l'équation de l'hyperbole. On peut donc déterminer à priori cette équation par en déterminant le dernier terme d'une manière que l'équation se décompose en facteurs du premier degré. On trouvera ainsi l'équation

$$Ay^2 + Bxy + Cx^2 + Dy + Ex + \frac{AE^2 - BDE + CD^2}{4AC - B^2} = 0$$

qui est la forme la plus générale. Sans système de deux droites et qui représenteront les asymptotes de toute courbe qui n'en a pas d'autres. Cherchant dans les points où ce système coupe les axes, on construira les asymptotes sans passer par des calculs avoir à construire de radicaux.

Telle est la marche générale à suivre quand on a l'équation de la courbe. Mais si elle est résolue par rapport à  $y$ , et que l'on ait

$$y = cx + d \pm m \sqrt{(x-k)^2 + n}$$

Voici la méthode d'après laquelle on peut se servir.

Développant le radical en série : il vient

$$y = cx + d \pm m(x-k) \pm \frac{m^2 n}{2x} \pm \frac{m^3 n^2}{4x^2} \dots$$

Si l'on fait  $x = \infty$ , dans cette équation elle devient  $y = cx + d \pm m(x-k)$ , et représente deux lignes droites qui sont par conséquent les asymptotes de l'hyperbole. On peut faire voir ici que l'asymptote peut s'éloigner aussi peu



## Questions de Physique.

---

1.° Une cloche cylindrique pleine d'air repose sur une cuve à mercure; le niveau du métal intérieur, est situé sur le prolongement du niveau extérieur, de sorte que la force élastique de l'air de la cloche est égale à celle de l'air environnant; la hauteur de la cloche est  $H$ , la pression est  $P$ ; on demande la valeur de la force élastique de l'air de la cloche quand on la soulèvera d'une quantité  $A$ .

2.° Développez la Théorie des vapeurs dans le vide.

---

Il est de toute nécessité que les élèves n'aient à leur disposition aucun livre de physique.

(\*) Indiquer ici les nom  
et prénoms.

(\*) Galois

né le                      an                      à                      département d

Élève du Collège

(\*\*)

(\*\*) Les élèves de la  
classe de Rhétorique indi-  
queront s'ils sont vété-  
rans.

(\*\*\*)

(\*\*\*) Placer ici la de-  
vise.

ARCHIVES  
NATIONALES

7607  
1re question. Une cloche cylindrique pleine d'air repose sur une cuve à mercure, le niveau du métal intérieur est situé sur le prolongement du niveau exté-  
rieur, de sorte que la force élastique de l'air de la cloche est égale à celle  
de l'air environnant: la hauteur de la cloche est  $H$ , la pression est  $P$ ;  
on demande la valeur de la force élastique de l'air de la cloche, quand on la soule-  
vera d'une quantité  $A$ .

Soit  $h$  la hauteur primitive de la cuve à mercure,  $s$  et  $t$  les surfaces respectives  
des parties de la cuve sous la cloche & hors de la cloche.

Appelons  $x$  la force élastique cherchée,  $y$  &  $z$  les hauteurs sous la  
cloche & hors de la cloche du mercure après l'opération indiquée;

La quantité d'air comprise sous la cloche après cette opération aura pour  
hauteur  $A + H + h - y$ . On aura donc la proportion

$$A + H + h - y : H :: P : x \quad (1)$$

puisque les volumes sont en raison inverse de pressions.

Ensuite, comme après l'opération, la pression supportée par le mercure  
sous la cloche,  $x$ , est hors de la cloche, toujours  $P$ , on aura

$$y : z :: P : x \quad (2)$$


Enfin le volume de mercure devant être le même avant & après l'opération,  
on aura nécessairement

$$sy + tz = h(s + t) \quad (3)$$

Éliminant entre ces trois équations  $y$  &  $z$ , on aura l'équation  
qui détermine  $x$ . Cette équation est

$$(A + H + h)t x^2 + [(A + H + h)s + tPH]x = P^2 st + Ph(s + t)$$

et comme ses termes extrêmes sont de signes contraires, elle aura  
deux racines de signes contraires, dont la positive sera la valeur cherchée.



## 2<sup>e</sup> Question.

La théorie des vapeurs dans le vide se différencie de celle des gaz permanents que parce que les vapeurs peuvent à certaines pressions et à certaines températures, se liquéfier. Les seules propriétés & caractéristiques des vapeurs sont donc les seules celles qui appartiennent au phénomène de la liquéfaction. Il y a pour chaque espèce de vapeur un degré de température au <sup>dessus</sup> duquel elle ne peut rester à l'état de gaz. Ce changement ne s'opère cependant pas de suite.

Lorsqu'une vapeur est renfermée dans un vase, et que la capacité du vase n'est pas assez grande pour la contenir à l'état de gaz, une partie de la vapeur se liquéfie.

~~Quant aux propriétés~~ —